

Beschreibung der Kartierung von 1985:

Bezeichnung

Datum 23.08.1985

Aktualisierungsdatum

Landkreis Erding

Naturraum Münchener Ebene

Beschreibung Verschilfter Kopfriedbestand am Fehlbach der Sempt, bei der Köckmühle.

Diese Zwickelfläche zwischen Lohmühlbach und Fehlbach weist einen **restlichen Kopfriedbestand (Schoenetum ferruginei) mit der gefährdeten Mehlsprimel und dem Sumpf-Herzblatt**

auf, der stark vom Schilf überwachsen wird.

Zum Fehlbachufer setzt sich die **Rispensegge** durch, wogegen ein gut ausgebildeter Saum mit der **Schnabelsegge** und der **Stumpflütigen Binse** (weist auf kalkreiche unbelastete Gewässerqualität hin) den westlichen Bach entlang besteht. Im Süden unmittelbarer Übergang in Kleingartenanlage, dort ist Nutzungsextensivierung notwendig.

Dieser Lohmühlbach zeichnet sich außerdem durch ein Kleinröhricht des stark gefährdeten

Kriechenden Sellerie aus, das bereits nördlich des Fischweihers auftritt (Teilfläche 3.2).

Abwärts zur Sempt besteht ein Kleinröhricht des Aufrechten Merks, das nach Einmündung des Fehlbachs in die Sempt nicht mehr vorkommt.

Der Fehlbach wird in seinem nördlichen Verlauf von einem Erlensaum begleitet.

Beschreibung der Kartierung von 2014:

Im südöstlichen Ortsteil Herdweg verläuft ein Weiherabfluss, der südlich der Verbindungsstraße Markt Schwaben-Pastetten in die Forstinninger Sempt mündet. Die flutende Vegetation, die eine Deckung von durchschnittlich 15% einnimmt, wird gebildet aus Schmalblättrigem Merk und Wasser-Minze. Im südlichen Abschnitt verläuft uferbegleitend ein Teichsimsen-Röhricht, im Mündungsbereich in die Forstinninger Sempt ein Schilf-Röhricht mit aspektbildenden Beständen der Ross-Minze. Im Ufersaum befinden sich eingestreute Gehölze (Gewöhnliche Esche, Schwarz-Erle).

Überschrift Auwälder mit Großröhricht im Ortsteil Herdweg (Gemeinde Ottenhofen)

Landkreis Erding

Naturraum Münchener Ebene

Datum 07.10.2013